



โรค พบผู้ป่วยปีละกว่า 1,000 คน เสียชีวิตปีละ 5-10 ราย ซึ่งเห็ดที่เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตส่วนใหญ่ คือ เห็ดระโงกพิษ (เห็ดระโงกหิน เห็ดระงาก หรือเห็ดไข่ตายซาก) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มเห็ดที่มีความคล้ายคลึงกับเห็ดระโงกขาว หรือไข่ห่านที่สามารถรับประทานได้ และเห็ดหมวกจีนที่มีลักษณะคล้ายกับเห็ดปลวกหรือเห็ดโคน

ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันจัดทำฐานข้อมูลเห็ดพิษและเห็ดรับประทานได้เป็นแหล่งอ้างอิงสายพันธุ์ในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ด้านงานวิจัย บริการวิชาการและความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยโดยการพัฒนา Application Mushroom Image Matching

'มมส'พัฒนาแอปฯ ตรวจเห็ด'มีพิษ-กินได้'

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) โดยคณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือ "การจัดทำฐานข้อมูลเห็ดพิษและเห็ดรับประทานได้ในประเทศไทยและการพัฒนา Application Mushroom Image Matching" ระหว่าง มมส กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

รศ.ดร.ขวัญเรือน นาคสุวรรณกุล ภัณฑารักษ์ประจำพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา มมส ระบุว่า สถานการณ์เห็ดพิษเกิดจากชาวบ้านมักเข้าไปเก็บเห็ดมาบริโภค โดยมีความเข้าใจและความเชื่อที่ไม่ถูกต้องในการระบุชนิดของเห็ดพิษและเห็ดที่รับประทานได้ จากรายงานข้อมูลเฝ้าระวังโรคของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุม

สำหรับบริการวิชาการและการเรียนการสอน อีกทั้งจัดทำคู่มือเห็ดพิษสำหรับ อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการเฝ้าระวังการรับประทานเห็ดพิษของประชาชนร่วมกัน

ฐานข้อมูลดังกล่าวคาดว่าจะสำเร็จพร้อมทดลองใช้ในเดือนสิงหาคมนี้